




NaiS / Formulaire 3

Bases spéciales pour la prise de décision et l'analyse des

effets

Commune: <u>Haut-Itzumeun</u>	Lieu: <u>les Chevalais</u>	Placette témoins n° <u>2</u>	Date: <u>08.10.2009</u>	auteur: <u>FP, FD, JR</u>															
Histoire du peuplement Peuplement issu d'un reboisement à la fin du 19 ^e siècle. (Avant : fûnage)		Surface du sol acide - aiguilles des épicéas ⇒ acidification du sol en surface		Végétation <table border="1"> <thead> <tr> <th>Espèces essentielles (aspect visuel)</th> <th>Recouvrement en %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>Marumiale vivace</u></td> <td><u>- 5%</u></td> </tr> <tr> <td><u>Pas d'autre végétation au sol</u></td> <td></td> </tr> <tr><td> </td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td></tr> </tbody> </table> Autres espèces:		Espèces essentielles (aspect visuel)	Recouvrement en %	<u>Marumiale vivace</u>	<u>- 5%</u>	<u>Pas d'autre végétation au sol</u>									
Espèces essentielles (aspect visuel)	Recouvrement en %																		
<u>Marumiale vivace</u>	<u>- 5%</u>																		
<u>Pas d'autre végétation au sol</u>																			
Atteintes / pollution 		Partie supérieure du sol 		Rajeunissement Aucun, pas de limite au sol Quelques tiges d'épicéas et de hêtres dans de petites trouées où la lumière arrive au sol.															
Dégâts Gibier supportable Risque phytosanitaire pour l'épicéa (bistrycte)		Partie inférieure du sol Rendzine calcaree 		Volume sur pied, accroissement, produits d'éclaircie <u>800 m³/ha</u> <u>(783 m³/ha en 2000)</u> Stade de développement / type de structure: Futaie moyenne pour l'épicéas															