

NaiS / Formulaire 3 **Bases spéciales pour la prise de décision et l'analyse des effets**

NaiS / Formulaire 3 **Bases spéciales pour la prise de décision et l'analyse des effets**

Commune / Lieu: Val-de-Charmey / Reposoirs		Plac.tém.: No. FR23	Date: 24.10.2017	Auteur: F. Vial, J.M. Chappalley		
Histoire du peuplement: Peuplement issu d'un reboisement Dégâts Lothar en 1999 Exploitation par ligne de câble en janv.-fév. 2016	Surface du sol: Eboulis actif sol peu profond, beaucoup de cailloux			Végétation:		
				Espèces essentielles (aspect visuel)		Recouvrem. en 1/10
				Oxalis acetosella		
				Dryopteris filix-mas / Athyrium filix-femina		
				Galium odoratum		
				Poa nemoralis		
		Lamium galeobdolon				
		Autres espèces:				
		"Etagenmoos", chèvrefeuille				
Atteintes / pollution:	Partie supérieure du sol: <p>Mor Moder Mull Représentation schématique de la structure d'un profil d'humus</p> <p>Couche organique</p> <p>Surface du sol</p> <p>Profondeur du mélange de la matière minérale avec la matière organique</p> <p>ér/Ahh ér/Ahh ér</p> <p>Activité biologique du sol croissante</p>			Rajeunissement: Principalement ép sa, ér's abroutis hê dans les trouées fr secs		
Dégâts: Abroutissements des sapins par chevreuil principalement + cerf	Partie inférieure du sol: 			Volume sur pied, accroissement, produits d'éclaircie: Selon inventaire en annexe		
			Stade de développement / type de structure: Futaie moyenne			