








### 3 - Beurteilung und Fazit

### Wirkungsanalyse - Schutzwaldpflege

	Vergleich Zustand vor Eingriff - Zustand heute	Beurteilung MN / Störungen	Vergleich Etappenziel - Zustand heute	Vergleich Zustand heute - Nais- minimal-ideal	Entwicklung (ohne / nach Massnahme)	<b>Gesamtbeurteilung</b> > Zusammenfassung auf Seite 1 übertragen
					in 50 Jahren	
					in 10 Jahren	
					heute	
					2009	
<b>Mischung</b> Art und Grad evtl. aufteilen nach Verj. und Oberschicht	Ta und Fi haben auf Kosten der Bu leicht zugenommen.	Keine Massnahme	Kein Etappenziel definiert.	Buche unter- und Fichte leicht übervertreten.		Mischungsverhältnis entwickelt sich in die richtige Richtung. Bei zukünftigen Eingriffen sollte die Buche gefördert werden.
<b>Gefüge vertikal</b> BHD-Streuung	Immernoch vier Durchmesserklassen vorhanden.	Keine Massnahme	Es hat mehr Durchmesserklassen vorhanden als ursprünglich vorgenommen.	Idealprofil übertroffen.		Durch die unterschiedlichen Wuchsbedingungen und den Vorwüchsen ist eine gute vertikale Struktur vorhanden.
<b>Gefüge horizontal</b> DG, Stammzahl, Lückenlänge, Querbäume, hohe Stöcke	DG hat naturgemäss zugenommen.	Keine Massnahme	Kein Etappenziel definiert.	Idealprofil übertroffen.		Die Sturmfläche wächst laufend zu und der Deckungsgrad dementsprechend auch.
<b>Stabilitätsträger</b> Kronenentwicklung, h/D, Zieldurchmesser	Stabilität der stärkeren Bäume immernoch vorhanden.	Keine Massnahme	Da im Gerinne nicht systematisch eingegriffen wurde, sind die dickeren Bäume immernoch vorhanden.	Nur vereinzelt leichte Hänger, Kronenlänge i.O.		Die meisten der stärkeren Bäume sind keine Hänger und sind somit gute Stabilitätsträger für den Bestand.
<b>Verjüngung</b> Keimbett	Z.T. noch verjüngungsungünstige Keimbette vorhanden, einige davon bepflanzt.	Kleinflächiges Ausmähen	Durch die zunehmende Beschattung des Bodens gibt es weniger Vegetationskonkurrenz.	Fläche mit starker Vegetationskonkurrenz ist teifer als 1/3		Fläche mit hoher Vegetationskurrenz nimmt laufend ab, da die Beschirmung ebenso zunimmt.
<b>Verjüngung</b> Anwuchs (10-40cm Höhe)	Wildverbiss hat sich im Vergleich zu 2009 verbessert.	Austrichtern; Gezielt Einzelschutz bei Ta, Dg, Bah.	Deutlich weniger Wildverbiss als vor 10 Jahren. DG 50% wurde deutlich übertroffen.	Minimalprofil nicht erfüllt, aber in diesem Stadium der Sukzession auch kein Thema.		Der Deckungsgrad der Fläche ist zu hoch, um einen hohen Anteil an Anwüchsen aufweisen zu können.
<b>Verjüngung:</b> <b>Aufwuchs</b> 40cm Höhe bis 12 cm BHD	Es sind mehr als genug zukunfts-fähige Trupps vorhanden.	Baumartenmischung	Mehr als genug Trupps vorhanden, bei der Baumartenmischung könnte z.T. mehr Lbh dabei sein.	Anzahl Trupps übertreffen Idealprofil, Mischung z.T. nicht immer zielgerecht.		Es sind mehr als genügend entwicklungsfähige Trupps vorhanden, der Laubholzanteil könnte etwas höher sein.